

Art	Beskrivelse	Tidligt løvfald	Velegnet rodsystem	Lysåben krone
Askebladet løn <i>Acer negundo</i>	Hurtigtvoksende, lysåbent træ med lysegule blomster inden løvspring og gule til orange høstfarver. Meget robust og tåler en række forskellige voksepladsforhold. Dybtgående rodsystem, men også øverlige og tætte rødder.		(x)	x
Alm. bærmispel <i>Amelanchier lamarckii</i>	Lille træ eller stor busk med dekorativ vækst, kobberrøde bladfarver i ud-spring, orangerøde høstfarver og tidligt løvfald. Mængder af hvide blomster i april. Blomsterne efterfølges af spiselige blåsorte bær. Rodsyste-met er øverligt og kompakt. Meget robust og tåler en række forskellige voksepladsforhold.	x		
Kamtjakabirk <i>Betula ermanii</i>	Crenehvid bark og mere skulpturel vækst end de almindeligt brugte <i>Betula pendula</i> . Træet får tidlige, guldgule høstfarver og tidligt løvfald. Birk har et meget øverligt og tæt rodsystem og bør derfor ikke anvendes, hvis der skal nedsættes urner.	x		x
Ægte kastanje <i>Castanea sativa</i>	Smukke bredkronede træer med dekorativ vækst og pælerodssystem, der gør dem velegnede til placering, hvor der skal kunne graves. Dekorative blomsterstande, frugter og fine gule høstfarver.		x	
Trompetkrone <i>Catalpa bignonioides</i>	Blomstrer i juli-august med smukke, hvide blomster, der efterfølges af lange dekorative bælg. Store blade, lysegule høstfarver og tidligt løvfald – praktisk af hensyn til grandækningen. Kompakt rodsystem, kan trives på fugtige jorder, men tåler også tørke.	x	x	
Tyrkisk hassel <i>Corylus colurna</i>	Meget regelmæssig vækst med tydeligt gennemgående stamme. Karakteristisk lysegrå, furet bark. Gule høstfarver og tidligt løvfald. Spiselige nødder, hvis dekorative tørre haser hænger længe på træet.	x		
Glansbladet hvidtjørn <i>Crataegus x lavallei</i>	Dekorativ skulpturel vækst, blomstring i maj med hvide blomster, der efterfølges af dekorative og holdbare orange frugter. Bladene holder sig meget længe på træet, så det egner sig ikke til steder, hvor der skal grandækkes. Dybtgående rødder.		x	
<i>Davidia involucrata</i> Duetræ	En smuk og usædvanlig blomstring med store, flagrende hvide "blomster" og pælerødder, der muliggør gravning. Et ikke uvæsentligt træk, hvis det drejer sig om brug af planter til urneplæner.		x	
Smalbladet sølvblad <i>Elaeagnus angustifolia</i>	Letløvet træ med grålige blade og små, duftende gule blomster, der efterfølges af spiselige frugter. I vintertilstand har de unge grene hvidlige barkfarver, der giver det en fin vintersilhouet. Træet er meget robust og tåler en række forskellige voksepladsforhold.			x
Mannaask <i>Fraxinus ornus</i>	Letløvet træ med store, duftende cremehvide blomsterstande i maj-juni. Høstfarver er ikke altid lige stabile, men kan være meget smukke i gult og violet. Tåler alle normale jordbundsforhold. Rodsyste-met er øverligt og kompakt. Angribes ifølge kilder ikke af asketoptørre.			x
Tretorn <i>Gleditsia triacanthos</i>	Dekorativ, skulpturel vækst, ret uanseelige, men duftende grøngule blomster, der efterfølges af meget lange brune bælg. Gule høstfarver. Solkrævende, men ellers meget voksepladstolerant træ. Fås også uden frugter: <i>G. triacanthos f. inermis</i> og som gulligløvet: 'Sunburst'.	x		x
Kinesertræ <i>Koeleruteria paniculata</i>	Et meget smukt letløvet mindre træ med et usædvanligt sent blomstrings-tidspunkt – først hen i juli-august viser de store stande af duftende gule blomster sig. Blomsterne efterfølges af oppustede frøstande, der er holder til hen på vinteren, ligesom træet får fine orangebrune høstfarver.			x
Korktræ <i>Phellodendron amurense</i>	Et sundt letløvet træ med dekorativ furet bark, gulgrønne blomster i juni, der efterfølges af sorte, ærtestore frugter. Guldgule høstfarver og tidligt løvfald, der tillader tidlig grandækning. Tåler alle normale jordbundsforhold.	x		x
Skovfyr <i>Pinus sylvestris</i> 'Glaucua'	Lysåbent stedsegrønt træ med lidt lavere vækst og mere markant blågrønne nåle end den almindelige skovfyr. Ligeså robust, men med lidt større prydværdi i kirkegårdssammenhænge.		x	x (som ældre)
Weichel <i>Prunus mahaleb</i>	Mindre, bredkronet træ med duftende hvide blomster i maj. Blomsterne efterfølges af spiselige, men lidt bitre, sorte frugter. Solkrævende, men ellers ret voksepladstolerant træ.		x	
Kinapære <i>Pyrus calleryana</i>	Smalkronet træ med hvide blomster samtidig med løvspring i begyndelsen af maj. Blomsterne efterfølges af små, uanseelige pærer. Bladene holder sig meget længe på træet, så det egner sig ikke til steder, hvor den skal grandækkes. Solkrævende, men ellers meget voksepladstolerant træ.		x	
Frynseeg <i>Quercus cerris</i>	Meget regelmæssig vækst med tydeligt gennemgående stamme. Dekorative frugter. Sent løvspring og løvfald, så det egner sig ikke til steder, hvor den skal grandækkes.		x	x
Krimlind <i>Tilia x euchlora</i>	Gule blomster i juli måned. Gule høstfarver. Unge grene intenst grønne eller gulgrønne, hvilket er med til at give træet lidt farve i vintertilstanden. Angri-bes ikke helt så hyppigt af bladlus som de øvrige linde.	x		